SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

RETRACTION PASTE

GB INSTRUCTIONS FOR USE

STORE THIS PRODUCT IN A COOL, DRY PLACE
Refrigeration will prolong shelf life, but avoid freezing. Bring to room temperature before use.

PRODUCT DESCRIPTION
Simplee Retraction Paste is a dental product capable of temporarily controlling gingival bleeding, displacing marginal gingiva and drying the gingival sulcus around a tooth.
The pastes allow the dental clinician to perform operative procedures without interference from blood, moisture or hyperplastic soft tissue.
Simplee Retraction Paste ist supplied in:
In 0.24 gram single-patient use, unit dose capsules, designed for use with a compatible dispensing gun.

INDICATIONS FOR USE
Simplee Retraction Paste is indicated for temporary retraction and hemostasis of the marginal gingival tissues during clinical procedures such as taking subgingival and periginigival dental impressions, seating of fixed prostheses, and restorative dentistry.

CONTRAINDICATIONS FOR USE
Simplee Retraction Paste should not be swallowed, and is contraindicated for use on or by persons who are allergic to or sensitive to aluminum chloride, silicate or other ingredients. Symptoms may include dermatitis or inflammatory reactions. If this occurs, discontinue use and obtain medical care immediately. The product should not be used in the presence of, and is not a treatment for, active periodontal disease.

PRECAUTIONS FOR USE
- Simplee Retraction Paste should be used in gingival sulci above the level of the junctional epithelium.
- The tip of the unit dose capsule should be held at the mouth of the sulcus, without actually entering into it. The paste should be expressed slowly into the sulcus, so as not to inject the material under pressure into the periodontal tissues.
- After the material has been in the sulcus for approximately 2 minutes, it must be completely removed. The sulcus should then be thoroughly rinsed with water and inspected for residual material so none is left behind on the gingiva or the tooth surface.

PRODUCT WARNINGS AND CLINICAL INFORMATION
- Store Simplee Retraction Paste in a cool dark place prior to use, sealed in the foil package.
- Unit dose capsules are single-patient use only, and should be discarded after use.
- Avoid sunlight or nearby heat sources. Shelf life will be reduced if not stored properly.
- Simplee Retraction Paste, like many agents used in dentistry to control bleeding, contains Aluminum Chloride. This may cause corrosion on some plastic or metal surfaces (even stainless steel). If left in extended contact. To protect dental instruments, always remember to rinse off Simplee Retraction Paste from their surface immediately after each use.
- If product accidentally contacts skin or eyes, wash with copious amounts of water. Obtain medical care if irritation occurs or persists.
- Do not ingest this product, and keep it away from children.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE
1. After tooth preparation is complete, rinse the sulcus with water. Gently dry with compressed air at an angle to the open sulcus, not directly into it.

2. Open the resealable foil package by tearing off the top where indicated. Save the bag for later storage. Remove a unit dose capsule from the package.

4. By using a unit dose capsule, insert it properly into a compatible gun, remove the cap and "start" the flow by extruding a small amount onto a pad first. It is recommended that a barrier bag is used with the compatible gun.

5. Express Simplee Retraction Paste around the tooth into the mouth of the gingival sulcus, until it is slightly overfilled with material. Do not force the capsule into the tissues. Allow the material to remain undisturbed in the sulcus for 2 minutes.

6. To increase gingival retraction, pre-made cotton compression caps (or standard cotton rolls cut into short sections) may be placed over the tooth, followed by 2 minutes of biting pressure by the patient's opposing teeth.

7. Simplee Retraction Paste remains pliable, and does not fully dry out in the sulcus. After 2 minutes, rinse it away with water and air and remove any remaining material using a non-cutting hand instrument or cotton pledget. Rinse and dry again. The sulcus is now ready for the impression or restorative procedure.

8. Unit dose capsules are for single-use on one patient only. Each time Simplee Retraction Paste is used on a different patient, apply a new unit dose capsule.

11. If you have any questions, call 1-800-243-7446 or e-mail info@parkell.com.

TIPS FOR DENTAL PRACTITIONERS
The following information should help dental practitioners reduce the risk of cross-contamination between patients when using Simplee dental dispensers: apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient; use new, uncontaminated gloves when handling multiple-use dental dispensers; utilize dental assistants to dispense material for the dentist; avoid contact of the reusable parts (e.g., the body of the multiple-use dental dispenser) with the patient's mouth; do not reuse the multiple-use dental dispenser if it becomes contaminated; do not reprocess a contaminated multiple-use dental dispenser by using chemical vapor sterilization; and do not immerse multiple-use dental dispensers in a high level chemical disinfectant, as this may damage the dispenser and the material contained in the device; do not sterilize multiple-use dental dispensers, as this may damage the material contained in the device.

DISPOSAL:
Dispose of the product in accordance with local regulations.

EVENTS:
Reportable incidences should be reported to Parkell and the competent authority in which the user and or patient is established.

WARRANTY AND TERMS OF USE
Do Not Warranty. For more information, please see www.parkell.com. Safety Data Sheets (SDS) are available at www.parkell.com.
Parkell's Quality System is certified to ISO 13485.

AVAILABLE PRODUCTS
Simplee Retractionpaste Capsules —
(30) unit dose capsules (0.24g/capsule)

D GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKT TROCKEN UND KÜHL LAGERN.
Durch Kühlung wird die Haltbarkeit verlängert. Einfrieren ist aber zu vermeiden. Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die hämostatische Gingiva-Retraktionspaste von Simplee ist ein Dentalprodukt zur vorübergehenden Kontrolle von Zahnfleischblutungen, Verdrängung der marginalen Gingiva und Trocknung des Sulcus um einen Zahn. Die Pasten ermöglichen dem Zahnarzt die Durchführung operativer Eingriffe ohne Interferenz von Blut, Feuchtigkeit oder hyperplastischem Weichgewebe.
Die Simplee Retraktionspaste ist in folgender Form erhältlich:
Simplee Retraktionspaste, gran in 0,24-g-Einzeldosis-Kapseln für den Einsatz mit einer geeigneten Pistolen-Applikator zur Verwendung mit einer kompatiblen Dosierpistole entwickelt.

INDIKATIONEN
Simplee Retraktionspaste ist indiziert für die vorübergehende Retraktion. Die Paste sollte langsam in den Sulcus gedrückt werden,um das Material nicht unter Druck in das parodontale Gewebe zu spritzen.
- Nachdem das Material etwa 2 Minuten lang im Sulcus war, muss es vollständig entfernt werden. Der Sulcus sollte gründlich mit Wasser gespült und auf verbleibendes Material überprüft werden, damit kein Material auf Gingiva oder Zahnoberfläche zurückbleibt.

WARNHINWEISE UND KLINISCHE ANGABEN
- Simplee Retraktionspaste vor dem Gebrauch in der verschweißten Folienverpackung kühl und dunkel lagern.
- Einzeldosis-Kapseln sind nur für den Gebrauch bei einem Patienten bestimmt und nach der Verwendung zu entsorgen.
- Sonnenlicht und in der Nähe befindliche Wärmequellen vermeiden. Bei nicht ordnungsgemäßer Lagerung verkürzt sich die Haltbarkeit.
- Simplee Retraktionspaste enthält wie viele in der Zahnmedizin zur Blutungskontrolle eingesetzte Wirkstoffe Aluminiumchlorid. Dies kann bei längerem Kontakt korrodierend auf bestimmte Kunststoff- oder Metalloberflächen (auch Edelstahl) wirken. Zum Schutz von Dentalinstrumenten Simplee Retraktionspaste stets unmittelbar nach Gebrauch von den Instrumentenoberflächen abspülen.
- Bei versehentlichem Kontakt mit Haut oder Augen mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Bedarf sofort medizinische Versorgung einleiten.
- Produkt nicht verschlucken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Nach abgeschlossener Präparation des Zahns den Sulcus mit Wasser spülen. Den geöffneten Sulcus vorsichtig mit Druckluft von der Seite trocknen, nicht direkt hinein.

2. Die wiederverschließbare Folienverpackung durch Abreißen des Abschnitts an der gekennzeichneten Seite öffnen. Verpackung für spätere Wiederverwendung aufbewahren. Die Einzeldosis-Kapsel aus der Packung entnehmen.

3. Bei Verwendung einer Einzeldosis-Kapsel diese ordnungsgemäß in eine kompatible Dosierpistole einlegen, die Kappe entnehmen und zunächst eine kleine Menge der Paste auf einen Anmischblock ausdrücken.

4. Simplee Retraktionspaste rund um den Zahn in den Sulcus gingivalis geben, bis der Überschuss der Paste leicht herausquillt. Die Spitze der Kapsel darf nicht mit Kraft in das Gewebe gedrückt werden. Die Paste 2 Minuten lang im Sulcus einwirken lassen.

5. Um die Gingiva-Retraktion zu verstärken, können fertige Kompressionskappen aus Baumwolle (oder in kurze Teile geschnittene Standard-Watterollchen) über dem Zahn platziert werden. Den Patienten dann 2 Minuten lang zubeißen lassen.

6. Simplee Retraktionspaste bleibt weich und trocknet im Sulcus nicht vollständig aus. Nach 2 Minuten unter Verwendung eines Luft-Wasser-Gemischs spülen und das restliche Material mithilfe eines nicht schneidenden Handinstruments oder eines Wattetupfers entfernen. Erneut spülen und trocknen. Der Sulcus ist jetzt bereit für die Abformung oder das restaurative Verfahren.

7. Einzeldosis-Kapsel gemäß den geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften bestimmen und entsorgen.
Einzeldosis-Kapseln sind ausschließlich für den Einmalgebrauch an einem Patienten bestimmt. Wenn Simplee Retraktionspaste bei einem anderen Patienten eingesetzt wird, muss immer eine neue Einzeldosis-Kapsel verwendet werden.

8. Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer +1-800-243-7446 oder per E-Mail an info@parkell.com.

TIPPS FÜR ZAHNÄRZTE
Die folgenden Informationen sollen Zahnärzten helfen, das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Patienten bei der Verwendung von Spendern zu verringern: Einweg-Schutzhüllen/Abdeckungen für Spender verwenden.
Tragen Sie stets frische Handschuhe, wenn Sie die Spender anfassen. Lassen Sie Material von zahnmedizinischen Assistenten bereitstellen. Kontakt zwischen Teilen, die mehrfach verwendet werden (z. B. dem Gefäß des Spenders) und dem Mund des Patienten vermeiden. Spender nicht länger verwenden, wenn er kontaminiert wurde. Verzichten Sie darauf, einen kontaminierten Spender mit chemischen Reinigungsdichten oder Desinfektionsmitteln zu reinigen, da dies den Spender und das darin enthaltene Material beschädigt werden könnte. Den Spender nicht sterilisieren, da dies das darin enthaltene Material beschädigen könnte.

ENTSORGUNG
Das Produkt gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

EREIGNISSE
Meldepflichtige Vorfälle sind Parkell und der zuständigen Behörde in dem Land, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, zu melden.

GARANTIE
Die vollständige Garantie und Nutzungsbedingungen finden Sie auf unserer Website www.parkell.com. Das Qualitätssicherungssystem von Parkell ist nach ISO 13485 zertifiziert. Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie unter www.parkell.com

VERFÜGBARE PRODUKTE
Simplee Retraktionspaste Kapseln —
(30) Unit Dose Kapseln (0.24g/ Kapsel)

F MODE D'EMPLOI

STOCKER CE PRODUIT DANS UN LIEU FRAIS ET SEC.
Le réfrodissement prolonge la durée de conservation, mais une congélation est à éviter. Amener à température ambiante avant utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT
La pâte de rétraction hémostatique gingivale de Simplee est un produit dentaire permettant de contrôler temporairement le saignement gingival, de déplacer la gencive marginale et de sécher le sillon gingival autour d'une dent.
Les pâtes permettent au dentiste de réaliser des soins sans l'interférence du sang, de l'humidité ou des tissus mous hyperplasiques.
La pâte de rétraction Simplee est disponible sous la forme suivante:
Pâte de rétraction Simplee, vert en capsules unidoses de 0,24 g à usage patient unique. Ils ont été conçus pour être utilisés avec un pistolet doseur compatible.

INDICATIONS D'UTILISATION
La pâte de rétraction Simplee est indiquée pour la rétraction provisoire et l'hémostase des tissus gingivaux marginaux pendant les procédures cliniques telles que la prise d'empreinte sous-gingivale et péri-gingivale, la pose de prothèses fixes et la dentisterie restauratrice.

CONTRE-INDICATIONS
La pâte de rétraction Simplee ne doit pas être avalée et son utilisation est contre-indiquée par ou sur les personnes allergiques ou sensibles au chlorure d'aluminium, aux silicates ou à des produits similaires. Les symptômes peuvent inclure la dermatite ou des réactions inflammatoires. Dans ce cas, interrompre l'utilisation et demander un avis médical immédiatement. Le produit ne doit pas être utilisé en cas de maladie parodontale active et n'est pas conçu pour traiter celle-ci.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- La pâte de rétraction Simplee doit être utilisé dans les sillons gingivaux au-dessus du niveau de l'épithélium de jonction.
- L'embout de la capsule unidose doit être maintenu à l'entrée du sillon sans y pénétrer. La pâte doit être appliquée doucement dans le sillon. Le matériau ne doit pas être injecté sous pression dans les tissus parodontaux.
- Deux minutes environ après l'application du matériau dans le sillon, il doit être totalement retiré. Le sillon doit être rincé soigneusement avec de l'eau et il convient de vérifier qu'il ne reste aucun résidu de matériau sur la gencive ou la surface dentaire.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE PRODUIT ET INFORMATIONS CLINIQUES
- Stocker la pâte de rétraction Simplee dans un endroit frais à l'abri de la lumière avant son utilisation, dans la pochette d'emballage fermée.
- Les capsules unidoses sont à usage patient unique et doivent être jetées après usage.
- Eviter les rayons du soleil ou la proximité de sources de chaleur. Un stockage inapproprié peut réduire la durée de vie.
- La pâte de rétraction Simplee, comme de nombreux agents utilisés en dentisterie pour contrôler les saignements, contient du chlorure d'aluminium. Ce dernier peut causer une corrosion sur certaines surfaces en plastique ou métal (même en acier inoxydable) utilisées en cas de contact prolongé. Pour protéger les instruments dentaires, toujours penser à rincer leur surface pour éliminer la pâte de rétraction Simplee immédiatement après chaque utilisation.
- En cas de contact accidentel du produit avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau. Demander un avis médical si nécessaire.
- Ne pas ingérer le produit et le tenir hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
1. Après la préparation de la dent, rincer le sillon avec de l'eau. Sécher doucement à l'air comprimé en choisissant un angle orienté indirectement vers le sillon ouvert.

2. Ouvrir la pochette refermable en tirant sur le haut à l'emplacement indiqué. Conserver la pochette en vue de stockage ultérieur. Retirer la capsule unidose de l'emballage.

3. En cas d'utilisation d'une capsule unidose, l'insérer doucement dans un pistolet compatible, retirer le bouchon et « commencer » par faire couler une petite quantité sur un tampon avant de premier temps.
4. Appliquer la pâte de rétraction Simplee autour de la dent à l'entrée du sillon gingival jusqu'à ce qu'il soit légèrement surchargé avec le matériau. Ne pas forcer la pointe de la capsule dans les tissus. Laisser la pâte reposer dans le sillon pendant 2 minutes.
5. Pour augmenter la rétraction gingivale, des bouchons de compression en coton et prêts à l'emploi (ou des rouleaux de coton standard coupés en petites sections) peuvent être placés sur la dent, puis soumis à la pression mastication pendant 2 minutes.
6. La pâte de rétraction Simplee reste souple et ne dessèche pas totalement dans le sillon. Au bout de 2 minutes, rincer avec de l'eau et de l'air et éliminer les résidus de matériau à l'aide d'un instrument à main non tranchant ou un tampon de coton. Rincer et sécher de nouveau. Le sillon est maintenant prêt pour la prise d'empreinte ou la restauration.
7. Jeter la capsule unidose en suivant la réglementation applicable en matière de sécurité et d'environnement. Les capsules unidoses sont à usage patient unique et doivent être jetées après usage. Pour chaque utilisation de pâte de rétraction Simplee pour un nouveau patient, prévoir une capsule unidose neuve.
8. Pour toute question, appeler le +1-800-243-7446 ou envoyer un courrier à info@parkell.com

CONSEILS POUR LES PRATICIENS DENTAIRES
Les informations suivantes devraient aider les praticiens dentaires à réduire le risque de contamination croisée entre les patients lors de l'utilisation d'applicateurs dentaires: Utiliser des manchons/enveloppes jetables sur les applicateurs dentaires.
Utiliser des gants neufs non contaminés lors de la manipulation d'applicateurs dentaires.
Utiliser les services d'un(e) assistant(e) dentaire pour appliquer le matériau.
Eviter le contact des éléments réutilisables (p. ex. le corps de l'applicateur dentaire) avec la bouche du patient.
Ne pas réutiliser un applicateur dentaire qui a été contaminé. Ne pas retraiter un applicateur dentaire contaminé avec des serviettes imbibées de produit chimique ou des désinfectants.
Ne pas immerger les applicateurs dentaires dans un désinfectant chimique de haut niveau car cela pourrait les endommager et abîmer le matériau contenu dans le dispositif.

MISE AU REBUT
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.

INCIDENTS
Tout incident grave doit être signalé à Parkell et à l'autorité compétente du pays où sont établis l'utilisateur et/ou le patient résidé.

GARANTIE
Pour en savoir plus sur la garantie complète et les conditions d'utilisation, consulter notre site Web www.parkell.com.
Le système de qualité Parkell est certifié ISO 13485. Pour les fiches de données de sécurité (FDS), consulter www.parkell.com.

PRODUITS DISPONIBLES
Simplee Retractionpaste Capsules —
(30) capsules à dose unitaire (0.24g/capsule)

I ISTRUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO PRODOTTO IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
La conservazione in frigorifero prolunga la durata, ma non congelare il prodotto. Portare a temperatura ambiente prima dell'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La pasta per retrazione gengivale Simplee è un prodotto per uso odontoiatrico in grado di garantire un controllo temporaneo del sanguinamento gengivale, la retrazione marginale della gengiva e l'asciugatura del solco gengivale intorno a un dente.
Questa pasta consente al dentista di eseguire procedure cliniche senza l'interferenza di sangue, umidità o tessuto molle iperplastico.
La pasta per retrazione gengivale Simplee è fornita nel seguente formato:
capsule monodose e monopaziente da 0,24 grammi, concepite per l'uso con un applicatore compatibile.

INDICAZIONI D'USO
La pasta per retrazione gengivale Simplee è indicata per la retrazione e l'emostasi temporanee dei tessuti gengivali marginali durante procedure cliniche, come la presa d'impronta sottogengivale e perigengivale, l'inserimento di protesi fisse e l'odontoiatria restaurativa.

CONTROINDICAZIONI
La pasta per retrazione gengivale Simplee non deve essere deglutita ed è controindicata per l'uso su o da parte di persone allergiche o sensibili al cloruro di alluminio, ai silicati o a sostanze simili. I sintomi possono includere dermatite o reazioni infiammatorie. Se si manifestano questi sintomi, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi immediatamente a un medico. Il prodotto non deve essere usato in caso di parodontite attiva, né è concepito per il trattamento di questa malattia dentale.

PRECAUZIONI PER L'USO
- La pasta per retrazione gengivale Simplee deve essere usata nei solchi gengivali sopra al livello dell'epitelio giunzionale.
- Il beccuccio della capsula monodose deve essere tenuto in corrispondenza dell'apertura del solco, senza penetrare realmente all'interno dello stesso. La pasta deve essere erogata lentamente nel solco, evitando di iniettare il materiale sotto pressione nei tessuti parodontali.
- Il materiale deve essere rimosso completamente dopo una permanenza nel solco di circa 2 minuti. Il solco deve essere accuratamente risciacquato con acqua e ispezionato per verificare che non ci siano residui di materiale sulla gengiva o sulla superficie del dente.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI CLINICHE SUL PRODOTTO
- Prima dell'uso, conservare la pasta per retrazione gengivale Simplee in un luogo fresco e buio, sigillato nella sua confezione di pellicola.
- Le capsule monodose sono esclusivamente monopaziente e devono essere gettate dopo l'uso.
- Evitare l'esposizione alla luce solare o a fonti di calore vicine. Una conservazione inappropriata può ridurre la durata del prodotto.
- La pasta per retrazione gengivale Simplee, come numerosi prodotti impiegati in odontoiatria per l'emostasi, contiene cloruro di alluminio. Questa sostanza può causare corrosione su alcune superfici in plastica o in metallo (anche acciaio inossidabile) in caso di esposizione prolungata. Per proteggere gli strumenti dentari, si raccomanda di sciacquare sempre la pasta per retrazione gengivale Simplee dalla superficie degli strumenti subito dopo l'uso del prodotto.
- In caso di contatto accidentale del prodotto con la pelle o gli occhi, sciacquare con abbondanti quantità di acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non ingerire questo prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO
1. Dopo aver terminato la preparazione del dente, risciacquare il solco con acqua. Asciugare delicatamente con aria compressa, dirigendo il getto d'aria in modo angolato, non direttamente all'interno del solco.
2. Aprire la confezione in pellicola risigillabile strappandola in corrispondenza della linea tratteggiata indicata. Conservare la confezione per la conservazione successiva. Rimuovere una capsula monodose dalla confezione.
3. Inserire correttamente la capsula monodose in un applicatore compatibile, rimuovere il tappo e "avviare" l'erogazione estrudendo una piccola quantità innanzitutto su un blocchetto. Si raccomanda di utilizzare una guarnizione compatibile con l'applicatore compatibile.
4. Estrudere la pasta per retrazione gengivale Simplee nel cavo orale, intorno al dente nel solco gengivale, finché la pasta non debordarà leggermente dal solco. Non forzare la capsula nei tessuti. Lasciare agire il materiale indisturbato nel solco per 2 minuti.
5. Per aumentare la retrazione gengivale, è possibile applicare sul dente una cappetta di compressione in cotone preformata (o rotoli in cotone standard tagliati in piccole sezioni), chiedere al paziente di occludere e mantenere la pressione occlusale per 2 minuti.
6. La pasta per retrazione gengivale Simplee rimane malleabile e non si asciuga completamente nel solco. Dopo 2 minuti, risciacquare con acqua, asciugare con aria e rimuovere eventuali residui di materiale con uno strumento manuale non tagliente o un tampone di cotone. Risciacquare e asciugare di nuovo. Il solco è ora pronto per la presa d'impronta o la procedura di restauro.
7. Le capsule monodose sono utilizzabili esclusivamente su un solo paziente. Ogni volta che la pasta per retrazione gengivale Simplee sia un paziente differente, utilizzare una nuova capsula monodose.
8. Per eventuali domande, chiamare il numero 1-800-243-7446 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@parkell.com.

CONSIGLI PER GLI ODONTOIATRI
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di aiutare gli odontoiatri a ridurre il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti durante l'uso di applicatori dentali multiuso: applicare guaine/involucri protettivi monouso sugli applicatori prima di utilizzarli su ciascun paziente; utilizzare guanti nuovi, non contaminati quando si manipolano applicatori dentali multiuso; avvalersi degli assistenti alla poltrona per l'erogazione del materiale nel cavo orale; evitare che le parti riutilizzabili (ad es. il corpo dell'applicatore dentale multiuso) vengano in contatto con la bocca del paziente; non riutilizzare l'applicatore dentale multiuso se è contaminato; non ricondizionare un applicatore dentale multiuso contaminato utilizzando solvente o disinfettanti chimici; non immergere gli applicatori dentali multiuso in un disinfettante chimico ad alto livello, poiché si potrebbero danneggiare l'applicatore e il materiale di cui è costituito; non sterilizzare gli applicatori dentali multiuso, poiché si rischia di danneggiare il materiale di cui sono costituiti.

SMALTIMENTO:
Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali.

INCIDENTI:
Gli incidenti segnalabili devono essere segnalati a Parkell e all'autorità competente nel paese in cui l'utilizzatore o il paziente è stabilito.

GARANZIA E CONDIZIONI D'USO
Per informazioni complete sulla Garanzia e sulle Condizioni d'Uso, consultare il sito www.parkell.com. Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito www.parkell.com. Il Sistema di Qualità di Parkell è certificato a norma ISO 13485.
PRODOTTI DISPONIBILI

Pasta per retrazione gengivale Simplee —
(30) capsule monodose (0,24 g/capsula)

NL NAVOD K POUŽITÍ

VÝROBEK UCHOVÁVEJTE NA CHLADNÉM, SUCHÉM MÍSTĚ
Zvolnost výrobku prodloužíte uchováváním v chladničce, ale chraňte ho před mrazem. Před použitím ho nechte ohřát na pokojovou teplotu.

POPIS VÝROBKU
Retrakční pasta Simplee je stomatologický přípravek, který dokáže dočasně zastavovat krvácení z dásní, odsunout okraje dásně a vysušit dásňový žlábek kolem zubu.
Pasta umožňuje zubnímu lékaři provádět operativní zákroky bez krve, vlhkosti nebo hyperplastických měkkých tkání.
Simplee retrakční pasta se dodává jako:
Kompule ze 0,24 gramu pro jednu pouzitit, určené k použití s kompatibilní dávkovací pistolí.

POKYNY K POUŽITÍ
Retrakční pasta Simplee je určena k dočasné retrakci a hemostáze okrajových částí dásně při klinických zákrocích, např. při snímání subgingiválních a perigingiválních zubních otisků, usazování fixních protéz nebo zubovéné stomatologii.

KONTRAINDIKACE
Retrakční pasta Simplee by neměla být polknuta a je kontraindikována pro použití u osob alergických/ych nebo citlivých na chlorid hlinitý, silikáty nebo podobné látky. Příznaky mohou zahrnovat dermatitidu nebo zánětlivé reakce. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek by neměl být používán v případě aktivního parodontálního onemocnění a není určen k jeho léčbě.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
- Retrakční pasta Simplee by měla být poškrtna ze kontraindikována pro použití u osob alergických/ych nebo citlivých na chlorid hlinitý, silikáty nebo podobné látky. Příznaky mohou zahrnovat dermatitidu nebo zánětlivé reakce. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek by neměl být používán v případě aktivního parodontálního onemocnění a není určen k jeho léčbě.
- Hrot kompule s jednorázovou dávkou přidržujte u ústí žlábku, ale nezavádějte ho do něj. Pastu vytlačujte pomalu, aby nedošlo ke vzniku materiálu pod tlakem do periodontálních tkání.
- Nechte materiál ve žlábku přibližně 2 minuty a poté ho kompletně odstraňte. Žlábek důkladně opláchněte vodou a zkontrolujte, zda na dásni nebo na povrchu zubu nezůstaly zbytky materiálu.

VAROVÁNÍ K VÝROBKU A KLINICKÉ INFORMACE
- Retrakční pastu Simplee uchovávejte před použitím na chladném místě, dobře uzavřenou v obalu.
- Kompule s jednorázovou dávkou jsou určeny pouze pro jednoho pacienta a po použití by měly být zlikvidovány.
- Chraňte přípravek před slunečním zářením a teplem. Při nesprávném uchovávání se zkracuje doba použitelnosti.
- Jako mnoho dalších látek používaných ve stomatologii k zástavě krvácení obsahuje retrakční pasta Simplee chlorid hlinitý. Ten může při delším kontaktu způsobovat korozi některých plastových nebo kovových povrchů (dokonce i nerezové oceli). Abyste chránili zubní nástroje, nezapomeňte retrakční pastu Simplee po každém použití vždy opláchnout z jejich povrchu.
- Při náhodném kontaktu výrobku s kůží nebo očima omyjte velkým množstvím vody. V případě potřeby okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek se pozření výrobku a uchovávejte ho mimo dosah dětí.

OBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ
1. Po dokončení preparace zubu vypláchněte žlábek vodou. Jemně vysuňte stlačeným vzduchem pod úhlem k otevřenému žlábku, ale ne přímo do něj.
2. Otevřete znovu uzavíratelný fóliový obal odtržením horní části na vyznačeném místě. Sáček uložte, abyste v něm pak mohli výrobek uchovávat. Vyjměte z balení jednu kompuli.
3. Kompuli s jednorázovou dávkou vložte do kompatibilní pistole, odstraňte víčko a vytlačením malého množství na podložku spuste tok materiálu. Doporučujeme používat s kompatibilní pistolí ochranný sáček.
4. Vytlačte retrakční pastu Simplee kolem zubu do ústí dásňového žlábku tak, aby byl materiálem mírně přeplněný. Netlačte kompuli na tkáně. Materiál nechte v klidu ve žlábku 2 minuty.
5. Pro retrakci větší části dásně lze na zub umístit předem připravené bavlněné kompresní čepičky (nebo standardní bavlněné válečky rozstřihané na kratké části) a požádat pacienta, aby do nich pořez 2 minuty kousal protilehlými zuby.
6. Retrakční pasta Simplee zůstává poddajná a ve žlábku nevysychá úplně. Po 2 minutách opláchněte vodou a osušte vzduchem a případné zbytky materiálu odstraňte ručním nástrojem, který neřeže, nebo bavlněným tamponem. Znovu vypláchněte a vysušte. Žlábek je nyní připravený na sejmutí otisku, resp. na zákrok.
7. Kompule s jednorázovou dávkou na jedno použití pouze u jednoho pacienta. Pokud chcete použít retrakční pastu Simplee u dalšího pacienta, použijte vždy novou kompuli s jednorázovou dávkou.
8. Pokud budete mít nějaké dotazy, zavolejte na telefonní číslo +1 800 243 7446 nebo pošlete e-mail na info@parkell.com.

DOPORUČENÍ PRO ZUBNÍ LÉKAŘE
Následující informace by měly zubním lékařům pomoci snížit riziko křížové kontaminace mezi pacienty při používání stomatologických dávkovačů pro opakované použití před použitím u každého pacienta navlékněte na stomatologické dávkovače pro opakované použití jednorázové bariérové návleky/obaly; při manipulaci se stomatologickými dávkovači pro opakované použití používejte nové, nekontaminované rukavice; k dávkování materiálu pro zubního lékaře používejte asistenty zubního lékaře; zabraňte kontaktu opakovaně použitelných částí (např. těla stomatologického dávkovače pro opakované použití) s pacientovými ústy; nepoužívejte stomatologický dávkovač pro opakované použití opakované použitelné, pokud je kontaminován; kontaminovaný stomatologický dávkovač pro opakované použití neobnovujte ubrousky nepoužívejte chemické páry; nepoužívejte stomatologický dávkovač pro opakované použití do vysoce účinných chemických dezinfekčních prostředků, protože by mohlo dojít k poškození dávkovače a materiálu obsaženého v prostředku; nesterilizujte stomatologické dávkovače pro opakované použití, protože by mohlo dojít k poškození materiálu obsaženého v prostředku.

LIKVIDACE:
Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY:
Nežádoucí příhody, které je nutné hlásit, hlásí společnosti Parkell a příslušnému úřadu v zemi, v níž má uživatel nebo pacient bydliště/sídlo.

ZÁRUKA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
Podrobné informace o záruce a podmínkách používání najdete na webu www.parkell.com. Bezpečnostní listy (BL) jsou dostupné na webu www.parkell.com. Systém kvality společnosti Parkell je certifikován podle ISO 13485.

DOSTUPNÉ VÝROBKY
Simplee retrakční pasta, kompule —
(30) kompulí s jednorázovou dávkou (0,24 g na kompuli)

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A TERMÉKET HŰVÖS, SZÁRAZ HELYEN TÁROLJA
A hűtés meghosszabbítja az eltarthatóságot, de kerülje a fagyasztást. Használat előtt hozza szobahőmérsékletre.

A TERMÉK LEÍRÁSA
A Simplee retrakciós paszták olyan fogászati termék, amely alkalmas a fogínyvérzés átmeneti csillapítására, a szabad ínyszél elmozdítására és a fog körüli ínyrés szárítására. A pasztákkal végzett műtéti eljárások fogorvos számára, hogy a vér, a nedvesség, illetve a hiperplasztikus lágyrészek zavaró hatásának kizárásával végezhessen sebészeti beavatkozásokat.
A Simplee retrakciós paszta a következő szállítási formában elérhető:
Zöld színű pasztás, 0,24 g-os, egyadagos, egy betegnél felhasználható, ínyvonal-rögzítéssel adagolható kapszulák.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVALLATOK
A Simplee retrakciós pasztа a szájsebészi műtétek során végzett klinikai eljárások, például szubgingivális és perigingivális fogászati lenyomatvétel, rögzítés, részleges protézisek beültetése során, valamint a helyreállító fogászatban.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ELLENJAVALLATOK
A Simplee retrakciós pasztát nem szabad lenyelni, és használata ellenjavallt az alumínium-klorid-ra, szilikátokra vagy hasonló termékekre allergiás vagy azokra érzékeny személyeknél. A tünetek közé tartozhat a dermatitis vagy a gyulladásos reakciók is. Ezek előfordulása esetén hagyja abba a használatát, és azonnal forduljon orvoshoz. A termék nem használható aktív parodontitis betegség esetén, és nem is alkalmas ilyen betegség kezelésére.

AZ ALKALMAZÁSSAL ELŐFORDULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
- A Simplee retrakciós pasztát a funkcionális ínyrés szintje felett, ínybarázdákban kell alkalmazni.
- Az egyadagos kapszula hegyét a barázda szélénél kell tartani anélkül, hogy belenyomnánk bennünket a barázdába. A pasztát lassan kell kinyomni az ínybarázdába, hogy ne fecskendezze be nyomás alatt az anyagot a parodontális szövetekbe.
- Miután az anyag ínybarázdában volt, el kell távolítani az összes anyagot. Az ínybarázdát alaposan le kell öblíteni vízzel, és meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e maradványok a fogon vagy a fog felületén.

TERMÉKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KLINIKAI INFORMÁCIÓK
- Felhasználás előtt tárolja a Simplee retrakciós pasztát hűvös, sötét helyen, lezárt fóliacsomagolásban.
- Az egyadagos kapszulák csak egy páciensnél használhatók, és használat után ártalmatlanítsa őket.
- Kerülje a napfényt és a közeli hőforrásokat. Nem megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő csökken.
- A Simplee retrakciós pasztа, akárcsak sok más, a fogászatban vérzéscsillapításra használt szer, alumínium-kloridot tartalmaz. Hosszabb idejű érintkezés esetén ez korróziót okozhat egyes műanyag- vagy fémfelületeken (még a rozsdamentes acélon is). A fogászati műszerek védelme érdekében ne felejtse el minden használat után alaposan leöblíteni a Simplee retrakciós pasztát a műszerfelületről.
- Ha a termék véletlenül a bőrre vagy a szembe kerül, mossa le bő vízzel. Szükség esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne nyelje le ezt a terméket, és tartsa távol a gyermekektől.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
1. Miután befejezte a fog előkészítését, öblítse le az ínybarázdát vízzel. Óvatosan szárítsa meg sűrített levegővel a nyitott ínybarázdára irányítva őket szögében, és nem közvetlenül az ínybarázdába irányítva a légáramot.
2.Nyissa fel a visszazárható fóliás csomagot úgy, hogy a jelzett helyen letépi a tetejét. Őrizze meg a tasakot a későbbi tároláshoz. Vegye ki a csomagolásból az egyadagos kapszulát.
3. Az egyadagos kapszula használatát esetén helyezze be a kapszulát egy kompatibilis adagolópisztolyba, vegye le a kupakot, és nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverőblokkra.
4. Nyomja Simplee retrakciós pasztát a fog körül ínybarázda szélébe, amíg

reprosesser en kontaminert dentaldispenser til flergangsbruk ved hjelp av kjemiske tørkeservietter eller desinfeksjonsmiddel; ikke legg dentaldispenseren til flergangsbruk med i høyeffektivt desinfeksjonsmiddel, da dette kan skade dispenseren og materialene som befinner seg i enheten; ikke steriliser dentaldispensere til flergangsbruk, da dette kann skade materialene som befinner seg i enheten.

AVFALLSHÅNDTERING
Produkter skal avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter

HENDELSER
Rapportér enhver hendelser skal rapporteres til Parkell og kompetent myndighet på stedet hvor bruker og/eller pasient har sitt faste opphaldssted.

GARANTI
For full garanti og alle bruksvilkår vennligst besøk www.parkell.com. Parkell's kvalitetsprogram er sertifisert til NS-EN ISO 13485.
For sikkerhetsdatablad (SDS), gå til www.parkell.com.

TILGJENGELIGE PRODUKT
Simplee Retraction Paste kapsler —
(30) engangsdose kapsler (0,24g/ kapsel)

GB KÄYTTÖOHJE

SÄILYTÄ TUOTETTA VIILEÄSSÄ JA KUIVASSA PAIKASSA.
Säilyttäminen jääkaapissa pidentää käyttöikää, mutta jäätymistä on vältettävä. Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä.

TUOTEKUVAUS
Simplee Retraction Paste hemostaattinen ikenen retraktiopasta on hammaslääketieteellinen tuote, jota käytetään ienvervenvuodon tilapäiseen hallintaan, ienrajan siirtoon ja ientaskun kuivaamiseen hampaanjäljen ottamista varten. Pastat helpottavat hammaslääkäreiden työskentelyä leikkaustoimenpiteissä poistamalla toimenpidealueelta veren, kosteuden ja hyperplastisen pehmytkudoksen.
Simplee Retraction Paste on saatavana:
Yhdelle potillaalle tarkoitetuissa 0,24 gramman kerta-annoskapseleissa, jotka on suunniteltu käyttöön yhteensopivan annostelijan kanssa.

KÄYTTÖALUEET
Simplee Retraction Paste hemostaattinen ikenen retraktiopasta on tarkoitettu ienvuotoon liittyvien potilaiden tilapäiseen retraktioon ja hemostaasiin kliinisten toimenpiteiden koten subgingivaalisten ja perigingivaalisten jäljentämisten aikaansaamiseksi. Käyttöturvallisuustiedote, katso www.parkell.com

SAATAVANA OLEVAT TUOTTEET
Simplee Retractionpaste kapsler —
(30) kerta-annoskapselia (0,24g/kapseli)

GB BRUGSANVISNING

OPBEVAR DETTE PRODUKT PÅ ET KØLIGT, TØRT STED
Opbevaring under køl vil forlænge holdbarheden, men undgå frysning. Bring til rumtemperatur inden brug.

PRODUKTBESKRIVELSE
Simplee Retraction-pastae er et dentalt produkt, der midlertidigt kan kontrollere tandkødsblødninger, forskudt marginal gingiva og tør tandkødsfornemme omkring en tand.
Pastaen er også til rådighed i engangsdoser, der er designet til brug med en kompatibel dispenserpistol.

INDIKATIONER FOR BRUG
Simplee Retraction-pastae er indiceret til midlertidig tilbagetrækning og hæmostase af det marginale tandkødsvæv under kliniske procedurer, såsom at tage sygningsfrie og præcise tandaftryk, montering af faste protéser og genoprettende tandbehandling.

KONTRAINDIKATIONER
Simplee Retraction-pastaen må ikke sluges og er kontraindiceret til brug på eller af personer, der er allergiske over for eller følsomme over for aluminiumklorid, silikater eller lignende produkter. Symptomer kan omfatte dermatitis eller inflammatoriske reaktioner. Stop brugen, hvis dette sker, og søg læge straks. Produktet bør ikke anvendes ved tilstedeværelse af, og er ikke en behandling for, aktiv paradentose.

SIKKERHEDSREGLER VED BRUG
• Simplee Retraction-pastae ber anvendes i gingivale sulci over niveauet for kontaktpunktet.
• Spidsen af enhedsdosiskapslen skal holdes ved mundingen af sulcus uden egentlig at trænge ind i den. Pastaen skal presses langsomt ind i sulcus for ikke at sprøjte materialet under tryk ind i det parodontale væv.
• Efter at materialet har været i sulcus i ca. 2 minutter, skal det fjernes helt. Sulcus skal skylles grundigt med vand og inspiceres for restmateriale, så intet efterlades på tandkødet eller tandoverfladen.
PRODUKTADVARSLER OG KLINISK INFORMATION
• Opbevar Simplee Retractionpaste på et køligt, mørkt sted for brug, for længst i følgedøkken.
• Enhedsdosiskapsler er kun til en enkelt patient og bør kasseres efter brug.
• Undgå sollys eller varmekilder i nærheden. Holdbarheden vil blive reduceret, hvis den ikke opbevares korrekt.
• Simplee Retractionpaste indeholder, ligesom mange midler, der bruges i tandpleje til at kontrollere bladninger, aluminiumklorid. Dette kan forårsage korrosion på nogle plast- eller metaloverflader (selv rustfrit stål), hvis udsat for længerevarende kontakt. Husk altid at skylle Simplee Retractionpaste af overfladen på dentalinstrumenterne umiddelbart efter hver brug for at beskytte dem.
• Vask med rigelige mængder vand, hvis produkter ved et uheld kommer i kontakt med hud eller øjne.Søg straks lægehjælp, hvis det er nødvendigt.
• Undlad at indtage dette produkt, og hold det væk fra børn.

GENEREL BRUGSANVISNING
1. Når forberedelsen af tanden er færdig, skylles sulcus med vand. Tør forsigtigt med luft, så kilt er synlig i den dybe sulcus. Ikke tørre kilden ind i den.
2. Åbn den genlukkelige foliepakke ved at rive toppen af, hvor det er angivet. Gem posen til senere opbevaring. Tag en enhedsdosiskapsel ud af pakken. 3. Indsæt en enhedsdosiskapsel korrekt i en kompatibel pistol, fjern hætten og „start" flowet ved først at ekstrudere en lille mængde på en vatrondel. Det anbefales at bruge en barrierepose sammen med den kompatible pistol.
4. Tryk Simplee Retractionpaste rundt om tanden ind i munden af gingival sulcus, indtil den er helt fyldt med materialet. Tving ikke kapslen ind i vævene. Lad materialet forblive ufors tyret i sulcus i 2 minutter.
5. For at øge tilbagetrækningen af tandkødet kan præfabrikerede ledningsstrømsholdere af bomuld eller standard bomuldsvatler skåret i korte stykker placeres over tanden, efterfulgt af 2 minutters bidetryk af patientens modstående tænder.
6. Simplee Retractionpaste fortsætter bejdelgt og tærer ikke helt ud i sulcus. Efter 2 minutter skylles pastaen væk med vand og luft. Fjern eventuelt resterende materiale ved hjælp af et ikke-skærende håndinstrument eller en monkey-tooth tørkestrut.
7. Enhedsdosiskapsler er kun til engangsbrug på én patient. Hver gang Simplee Retractionpaste skal bruges på en anden patient, påbøres en ny enhedsdosiskapsel.
8. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på 1-800-243-7446 eller e-maile til info@parkell.com.

TIPS TIL TANDLÆGER
Følgende oplysninger skal hjælpe tandlæger med at reducere risikoen for krydskontaminering mellem patienter, når de bruger tanddispenser til flere anvendelser. Parkell anbefaler, at tandlæger, der bruger en tandpistol til flergangs-tanddispensere før brug med hver patient; brug nye, ikke-kontaminerede handsker til hver patient; rengør og desinficer flergangs-tandpistolen brug tandlægeassistenter til at dispensere materiale til tandlægen; undgå kontakt mellem de genanvendelige dele (f.eks. selve flergangs-kattandspenderen) med patienters mund; genbrug ikke flergangs-tandsdispenseren, hvis den bliver forurenet; klargør ikke en kontamineret flergangs-tandpistol gennem ved at bruge kemiske servietter eller desinfektionsmidler; nedsænk ikke flergangs-tandspenseren i et kemisk desinfektionsmiddel på høit niveau, da dette kan beskadige dispenseren og materialet i enheden; Steriliser ikke flergangs-tandspenseren, da dette kan beskadige materialet i enheden.

BORTSKAFFELSE
Borskaf produkter i overensstemmelse med lokale regler.

HÆNDELSER
Rapporterbare forekomster skal rapporteres til Parkell og den kompetente myndighed, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

GARANTI OG BETINGELSER FOR BRUG
Se www.parkell.com for fuldstændige oplysninger om garanti og brugsbetingelser. Sikkerhedsdatablade (SDS) er tilgængelige på www.parkell.com. Parkells kvalitetssystem er certificeret til ISO 13485.

TILGÆNGELIGE PRODUKTER
Simplee Retractionpaste-kapsler —
(30 enkeltdosiskapsler (0,24 g/kapsel)

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η συσκευασία πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά δεν πρέπει να παγώνει. Πριν τη χρήση, αφήστε το προϊόν να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η πάστα Simplee Retraction είναι ένα οδοντιατρικό προϊόν που μπορεί προσωρινά να ελέγξει την αιμορραγία των ούλων, τη μετατοπισμένη περιφερική περιοδοντική νόσο και την αίσθηση στεγνότητας γύρω από ένα δόντι.
Η πάστα διατίθεται επίσης σε δόσεις μίας χρήσης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με συμβατό πιστόλι διανομέα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η πάστα Simplee Retraction προορίζεται για προσωρινή υποχώρηση και αιμόσταση του περιθωριακού ουλικού ιστού κατά τη διάρκεια κλινικών διαδικασιών, όπως η λήψη αποτυπωμάτων χωρίς ούλα και ακριβή, η τοποθέτηση σταθερών προσθετικών αποκαταστάσεων και άλλες θεραπείες αποκατάστασης των δοντιών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η πάστα δεν πρέπει να καταπίνεται και αντενδείκνυται για χρήση σε ή από άτομα που είναι αλλεργικά ή ευαίσθητα σε χλωριούχο αργίλιο, πυριτικά άλατα ή παρόμοια προϊόντα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δερματίτιδα ή φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Διακόψτε τη χρήση εάν συμβεί αυτό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε είναι θεραπεία για ενεργή περιοδοντική νόσο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Η πάστα Simplee Retraction πρέπει να χρησιμοποιείται στα ουλικά σουλκούς πάνω από το επίπεδο του σημείου επαφής.
• Η άκρη της κάψουλας μονάδας δόσης πρέπει να τοποθετείται στο στόμιο του σουλκού χωρίς πραγματικά να διεισδύει σε αυτό. Η πάστα πρέπει να πιέζεται αργά στο σουλκούλι για να μην εκτοξεύεται το υλικό υπό πίεση στους παρωδοντικούς ιστούς.
• Αφού η πάστα παραμείνει στο σουλκούλι για περίπου 2 λεπτά, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Το σουλκούλι πρέπει να ξεπλένεται καλά με νερό και να επιθεωρείται για υπολειμματικό υλικό, έτσι ώστε να μην παραμένει υλικό στην επιφάνεια των δοντιών ή των ούλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αποθηκεύστε την πάστα Simplee Retraction σε δροσερό, σκοτεινό μέρος για χρήση, μακριά από τα μάτια των παιδιών.
• Οι κάψουλες μονάδας δόσης προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.
• Αποφύγετε το φως του ήλιου και τις πηγές θερμότητας. Η διάρκεια ζωής θα μειωθεί εάν δεν αποθηκευτεί σωστά.
• Η πάστα Simplee Retraction περιέχει, όπως πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική περίθαλψη για τον έλεγχο της αιμορραγίας, χλωριούχο αργίλιο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε ορισμένες μεταλλικές ή μεταλλικές επιφάνειες (ακόμη και στο ανοξείδωτο ατσάλι), εάν παραμείνει σε επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φροντίστε πάντα να ξεπλένετε καλά την πάστα Simplee Retraction από τις επιφάνειες των οδοντιατρικών οργάνων για να τα προστατεύσετε.
• Πλύνετε με άφθονες ποσότητες νερού εάν τα προϊόντα έρθουν κατά λάθος σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο.
• Μην καταναλώνετε αυτό το προϊόν και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία των δοντιών, ξεπλύνετε το σουλκούλι με νερό. Στεγνώστε απαλά με αέρα, έτσι ώστε η σφήνα να είναι ορατή στο βαθύ σουλκούλι. Μην στεγνώνετε τη σφήνα.
2. Ανοίξτε τη συσκευασία φύλλου που μπορεί να κλείσει ξανά, σκίζοντας την κορυφή όπου υποδεικνύεται. Φυλάξτε το σακουλάκι για μελλοντική αποθήκευση. Αφαιρέστε μία κάψουλα μονάδας δόσης από το πακέτο.
3. Τοποθετήστε μία κάψουλα μονάδας δόσης σωστά σε ένα συμβατό πιστόλι, αφαιρέστε το καπάκι και πατήστε «έναρξη» για να ρέει πρώτα μια μικρή ποσότητα σε ένα βαμβακερό ρουλεμάν. Συνιστάται η χρήση ενός φραγμού μαζί με το συμβατό πιστόλι.
4. Τοποθετήστε την πάστα Simplee Retraction γύρω από το δόντι στο στόμα σε ουλικό σουλκούλι, μέχρι να γεμίσει εντελώς με το υλικό. Μην πιέζετε τη συσκευή στο σουλκούλι. Αφήστε το υλικό να παραμείνει στο σουλκούλι χωρίς πίεση για 2 λεπτά.
5. Για να αυξήσετε την υποχώρηση των ούλων, μπορούν να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι βαμβακεροί αγωγοί ή τυπικά βαμβακερά μαλλί σε κοντά κομμάτια πάνω από το δόντι, ακολουθούμενα από δάγκωμα για 2 λεπτά από τα απέναντι δόντια του ασθενούς.
6. Η πάστα Simplee Retraction συνεχίζει να διαβρώνει και να διαβρώνει τους ιστούς στο σουλκούλι. Μετά από 2 λεπτά, η πάστα ξεπλένεται με νερό και αέρα. Αφαιρέστε τυχόν υπολειμματικό υλικό χρησιμοποιώντας ένα μη κοπτικό χειρόγραφο ή μια βούρτσα για τα δόντια του πιθήκου.
7. Οι κάψουλες μονάδας δόσης προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Κάθε φορά που η πάστα Simplee Retraction πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό ασθενή, πρέπει να τοποθετείται μια νέα κάψουλα μονάδας δόσης.
8. Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να καλέσετε στο 1-800-243-7446 ή να στείλετε e-mail στο info@parkell.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ
Οι παρακάτω πληροφορίες θα πρέπει να βοηθήσουν τους οδοντιάτρους να μειώσουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ ασθενών όταν χρησιμοποιούν διανομέα πολλαπλών χρήσεων. Η Parkell συνιστά στους οδοντιάτρους που χρησιμοποιούν διανομέα οδοντιατρικής χρήσης πολλαπλών χρήσεων με κάθε ασθενή· χρησιμοποιήστε καινούρια, μη μολυσμένα γάντια· καθαρίστε και απολυμάνετε το πιστόλι διανομής πολλαπλών χρήσεων· αποφύγετε την επαφή μεταξύ των επαναχρησιμοποιήσιμων μερών (δηλαδή, του ίδιου του διανομέα οδοντιατρικής χρήσης πολλαπλών χρήσεων) και του στόματος του ασθενούς· μην χρησιμοποιείτε ξανά τον διανομέα πολλαπλών χρήσεων εάν μολυνθεί· προετοιμάστε ένα μολυσμένο πιστόλι διανομής πολλαπλών χρήσεων μέσω χημικών χαρτομάντιλων ή απολυμαντικών διαλυμάτων· μην βυθίζετε τον διανομέα πολλαπλών χρήσεων σε χημικό απολυμαντικό υψηλού επιπέδου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον διανομέα και στο υλικό στο εσωτερικό της συσκευής· μην αποστειρώνετε τον διανομέα πολλαπλών χρήσεων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο υλικό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Απορρίψτε τα προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Τα συμβάντα που πρέπει να αναφερθούν θα πρέπει να αναφερθούν στην Parkell και στην αρμόδια αρχή στην οποία είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Για πλήρη εγγύηση και όρους χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.parkell.com. Το πρόγραμμα ποιότητας της Parkell είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 13485.
Για δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS), μεταβείτε στη διεύθυνση www.parkell.com.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κάψουλες πάστας Simplee Retraction —
(30) μονοδοσικές κάψουλες (0,24 γρ./κάψουλα)

GB INSTRUCCIONES DE USO

CONSERVE EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
El envase debe conservarse en el refrigerador para prolongar su vida útil, pero no debe congelarse. Antes de su uso, deje que el producto alcance la temperatura ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La pasta Simplee Retraction es un producto dental que puede controlar temporalmente el sangrado de las encías, el margen gingival desplazado y la sensación de sequedad alrededor de un diente.
La pasta también está disponible en dosis individuales diseñadas para su uso con una pistola dispensadora compatible.

INDICACIONES DE USO
La pasta Simplee Retraction está indicada para la retracción temporal y la hemostasia del tejido gingival marginal durante procedimientos clínicos, como la toma de impresiones precisas y sin encías, la colocación de prótesis fijas y otros tratamientos de restauración dental.

CONTRAINDICACIONES
La pasta no debe ingerirse y está contraindicada para su uso en personas o por personas alérgicas o sensibles al cloruro de aluminio, a los silicatos o a productos similares. Los síntomas pueden incluir dermatitis o reacciones inflamatorias. Deje de usarlo si esto ocurre y busque atención médica inmediatamente. El producto no debe utilizarse en presencia de periodontitis activa ni como tratamiento para esta.

PRECAUCIONES DE USO
• La pasta Simplee Retraction debe aplicarse en los surcos gingivales por encima del nivel del punto de contacto.
• La punta de la cápsula de dosis unitaria debe colocarse en la boca del surco sin penetrar en él. La pasta debe presionarse lentamente en el surco para evitar que el material se inyecte a presión en los tejidos periodontales.
• Una vez que la pasta haya estado en el surco durante unos 2 minutos, debe retirarse por completo. El surco debe enjuagarse bien con agua y examinarse para comprobar que no quede material residual, de modo que no quede material en la superficie de los dientes o las encías.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN CLÍNICA
• Guarde la pasta Simplee Retraction en un lugar fresco y oscuro, fuera del alcance de los niños.
• Las cápsulas de dosis unitaria están destinadas a un solo paciente y deben desecharse después de su uso.
• Evite la luz solar y las fuentes de calor. La vida útil se reducirá si no se almacena correctamente.
• La pasta Simplee Retraction contiene, como muchos fármacos que se utilizan en odontología para controlar el sangrado, cloruro de aluminio. Esto puede provocar corrosión en algunas superficies metálicas o de aleación metálica (incluso en el acero inoxidable), si se deja en contacto durante un período prolongado. Asegúrese siempre de enjuagar la pasta Simplee Retraction de las superficies de los instrumentos dentales después de su uso para protegerlos.
• Lave con abundante agua si los productos entran en contacto accidentalmente con la piel o los ojos. Busque atención médica de urgencia si es necesario.
• No ingiera este producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO
1. Una vez finalizada la preparación del diente, enjuague el surco con agua. Seque suavemente con aire, de modo que la cuña sea visible en el surco profundo. No seque la cuña.
2. Abra el envase de lámina resellable rasgando la parte superior donde se indica. Guarde la bolsa para su almacenamiento posterior. Retire una cápsula de dosis unitaria del paquete.
3. Coloque correctamente una cápsula de dosis unitaria en una pistola compatible, retire la tapa y pulse «inicio» para dispensar primero una pequeña cantidad en una bola de algodón. Se recomienda utilizar una barrera junto con la pistola compatible.
4. Coloque la pasta Simplee Retraction alrededor del diente en la boca en el surco gingival, hasta que esté completamente lleno del material. No fuerce la cápsula en el surco. La pasta debe aplicarse lentamente en el surco para evitar que el material se inyecte a presión en los tejidos periodontales. Deje que el material permanezca en el surco sin presión durante 2 minutos.
5. Para aumentar la retracción de las encías, se pueden colocar hilos conductores de algodón prefabricados o rollos de algodón estándar cortados en trozos cortos sobre el diente, seguidos de 2 minutos de mordida con los dientes opuestos del paciente.
6. La pasta Simplee Retraction continúa mordiendo y erosionando los tejidos en el surco. Después de 2 minutos, la pasta se enjuaga con agua y aire. Retire cualquier material residual con un instrumento manual de corte o un cepillo de dientes para monos.
7. Las cápsulas de dosis unitaria son solo para un paciente y deben desecharse después de su uso. Cada vez que la pasta Simplee Retraction vaya a utilizarse en un paciente diferente, se debe colocar una nueva cápsula de dosis unitaria.
8. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-800-243-7446 o envíe un correo electrónico a info@parkell.com.

CONSEJOS PARA ODONTÓLOGOS
La siguiente información debería ayudar a los odontólogos a reducir el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes cuando utilicen un dispensador de uso múltiple. Parkell recomienda que los odontólogos que utilicen un dispensador dental de uso múltiple con cada paciente: utilicen guantes nuevos y no contaminados; limpien y desinfecten la pistola dispensadora de uso múltiple; eviten el contacto entre las piezas reutilizables (es decir, el propio dispensador dental de uso múltiple) y la boca del paciente; no reutilicen el dispensador de uso múltiple si se contamina; preparen una pistola dispensadora de uso múltiple contaminada mediante toallitas químicas o desinfectantes; no sumerjan el dispensador de uso múltiple en un desinfectante químico de alto nivel, ya que esto podría dañar el dispensador y el material que contiene; no esterilicen el dispensador de uso múltiple, ya que esto podría dañar el material que contiene.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Deseche los productos de acuerdo con la normativa local.

INCIDENTES
Los incidentes notificables deben notificarse a Parkell y a la autoridad competente en la que esté establecido el usuario y/o el paciente.

GARANTÍA Y CONDICIONES DE USO
Para obtener información completa sobre la garantía y las condiciones de uso, visite www.parkell.com. Parkell cuenta con un sistema de calidad certificado según la norma ISO 13485.
Para acceder a las fichas de datos de seguridad (FDS), visite www.parkell.com.

PRODUCTOS DISPONIBLES
Cápsulas de pasta Simplee Retraction —
(30) cápsulas de dosis unitaria (0,24 g/cápsula)

GB NAVODILA ZA UPORABO

IZDELEK SHRANITE NA HLADNEM IN SUHEM MESTU
S shranjevanjem v hladilniku se rok uporabnosti podaljša, vendar pa se izogibajte zamrzovanju. Pred uporabo izdelek segrejte na sobno temperaturo.

OPIS IZDELKA
Retrakcijska pasta Simplee je zobozdravstveni izdelek, ki lahko začasno začasen nadzor krvavitve dlesni, premakne rob dlesni in izsuši gingivalni sulkus okoli zoba.
Pasta zobozdravniku omogoča izvajanje operativnih posegov brez motenj zaradi krvi, vlažnosti in hiperplastičnega mehkega tkiva.
Retrakcijska pasta Simplee je na voljo v:
0,24-gramskih kapsulah z odmerkom za enkratno uporabo za posameznega pacienta, namenjenih za uporabo z združljivo dozirno pištolo.

INDIKACIJE ZA UPORABO
Retrakcijska pasta Simplee je indicirana za začasno retrakcijo in hemostazo obrobnih gingivalnih tkiv med kliničnimi postopki, kot so jemanje subgingivalnih in peringingivalnih zobnih odtisov, nameščanje fiksnih protez in restavrativno zobozdravstvo.

KONTRAINDIKACIJE ZA UPORABO
Retrakcijske paste Simplee pacient ne sme pogoltniti in je kontraindicirana za uporabo pri osebah, ki so alergične ali občutljive na aluminijev klorid, silikate ali podobne izdelke.
Simptomi so med drugim lahko dermatitis ali vnetne reakcije.
Če se to pojavi, izdelek takoj prenehajte uporabljati in takoj poiščite zdravniško pomoč. Izdelek se ne sme uporabljati ob prisotnosti aktivne parodontalne bolezni in ni namenjen zdravljenju te bolezni.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO
• Retrakcijsko pasto Simplee je namenjena za uporabo v gingivalnih sulkusih nad nivojem junkcijskega epitelija.
• Konico kapsule z odmerkom je treba držati ob ustju sulkusa, vendar vanj ne sme vstopiti. Pasta se mora počasi vbrizgati v sulkus, da se material pod pritiskom ne vbrizga v obzobna tkiva.
• Potem ko je material v sulkusu približno 2 minuti, ga je treba popolnoma odstraniti. Sulkus je treba temeljito sprati z vodo in se prepričati, da na njem ni ostankov materiala, da ne bi ostal na zlesni ali zobni površini.

OPOZORILA IN KLINIČNE INFORMACIJE O IZDELKU
• Retrakcijsko pasto Simplee pred uporabo shranite na hladnem in temnem mestu, zaprtega v embalaži iz folije.
• Kapsule z odmerkom so namenjene uporabi za zdravo pri enem pacientu in jih je treba po uporabi zavreči.
• Pazite, da izdelek ne bo izpostavljen sončni svetlobi ali bližnjim virom toplote. Rok uporabe se skrajša, če izdelek ni pravilno shranjen.
• Retrakcijska pasta Simplee, tako kot številna sredstva, ki se v zobozdravstvu uporabljajo za prepričevanje krvavitev, vsebuje aluminijev klorid.
Ta material lahko na nekaterih plastičnih ali kovinskih površinah (tudi na nerjavnem jeklu) povzroči korozijo, če povišne ostanejo v stiku daljši časa.
Za zaščito zobozdravstvenih instrumentov retrakcijske paste Simplee ne pozabite sprati z njihove površine takoj po vsaki uporabi.
• Če izdelek pride v stik s kožo ali očmi, ga speri te z veliko količino vode. Po potrebi takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Izdelka ne zaužijte in ga hranite tako, da bo nedosegljiv otrokom.

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO
1. Ko je priprava zoba končana, izperite sulkus z vodo. S stisnjenim zrakom pod kotom ga nežno osušite proti odprtini sulkusa in ne neposredno vanjo.
2. Odprite embalažo iz folije, ki jo je mogoče ponovno zapreti, in odtrgajte zgornji del na označenem mestu. Vrečko shranite za poznejše shranjevanje izdelkov. Iz embalaže odstranite kapsulo z odmerkom.
3. Kapsulo z odmerkom pravilno vstavite v združljivo pištolo, odstranite pokrovček in vzpostavite pretok toka, da najprej iztisnete majhno količino na bikonico. Priporočljivo je, da se z združljivo pištolo uporablja bariera vrečka.
4. Retrakcijsko pasto Simplee iztisnite okoli zoba v ustje gingivalnega sulkusa, dokler ni nekaliko prenapolnjen z materialom. Kapsule ne potiskajte v sklus. Material 2 minuti pustite nemoteno v sulkusu.
5. Za povečanje retrakcije dlesni lahko na zob namestite vnaprej pripravljene bombažne kompresijske kapice (ali standardni bombažni zvitki, razrezani na kratke dele), nato pa naj jih pacient z nasprotnimi zobmi stisne in ugriz zadrži 2 minuti.
6. Retrakcijska pasta Simplee ostane gibljiva in se v sulkusu ne posuši v celoti.
Po 2 minutah ga sperite z vodo in spihajte z zrakom ter odstranite vse preostale snovi z ročnim instrumentom, ki ne reže, ali z bombažnim robčkom. Izperite in ponovno posušite. Sulkus je zdaj pripravljen za odvzem odtisa ali restavracijski postopek.
7. Kapsule z odmerkom so namenjene samo za enkratno uporabo pri enem pacientu. Vsakič, ko se retrakcijska pasta Simplee uporablja pri drugem bolniku, uporabite novo kapsulo z odmerkom na ensto.
8. Če imate kakršno koli vprašanje, pokličite 1-800-243-7446 ali pošljite e-pošto na info@parkell.com.

NASVETI ZA ZOBOZDRAVNIKE
Naslednje informacije so namenjene zobozdravnikom za pomoč pri zmanjševanju tveganja navzkrižne kontaminacije med pacienti pri uporabi večuporabnega dozirnikov za večkratno uporabo.
pred uporabo pri vsakem pacientu na zobozdravstvene dozirnike za večkratno uporabo namestite barierne rokave/ovoje za enkratno uporabo; zobozdravnice z zobozdravstvenimi dozirniki za večkratno uporabo pred uporabo pri vsakem pacientu na zobozdravstvene dozirnike za večkratno uporabo namestite barierne rokave/ovoje za enkratno uporabo; zobozdravnice z zobozdravstvenimi dozirniki za večkratno uporabo; nenikrdne rokavice; doziranje materiala zobozdravstvenega dozirnika za večkratno uporabo v pacienta; ne uporabljajte znova; kontaminiranega zobozdravstvenega doznika za večkratno uporabo ne reprocesirajte s kemičnimi robčki ali razkužili; zobozdravstvenih dozirnikov za večkratno uporabo ne potapljajte v visokonivojsko kemično dezinfekcijsko sredstvo, saj lahko to poškoduje dozirnik in material pripomočka; zobozdravstvenih dozirnikov za večkratno uporabo ne sterilizirajte, saj se lahko tako poškoduje material pripomočka.

ODSTRANJEVANJE
Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

DOGODKI
O zapletih, o katerih je treba poročati, je treba obvestiti družbo Parkell in pristojni organ, v katerem je uporabnik in/ali bolnik prebivališče.

GARANCIJA IN POGOJI UPORABE
Vse informacije o garanciji in pogojih uporabe preberite na www.parkell.com. Varnostni listi so na voljo na spletnem mestu www.parkell.com. Sistem kakovosti družbe Parkell je certificiran v skladu s standardom ISO 13485.

RAZPOLOŽLJIVI IZDELKI
Retrakcijska pasta v kapsulah Simplee —
(30) kapsul z enoto odmerka (0,24 g/kapsulo)

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η συσκευασία πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά δεν πρέπει να παγώνει. Πριν τη χρήση, αφήστε το προϊόν να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η πάστα Simplee Retraction είναι ένα οδοντιατρικό προϊόν που μπορεί προσωρινά να ελέγξει την αιμορραγία των ούλων, τη μετατοπισμένη περιφερική περιοδοντική νόσο και την αίσθηση στεγνότητας γύρω από ένα δόντι.
Η πάστα διατίθεται επίσης σε δόσεις μίας χρήσης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με συμβατό πιστόλι διανομέα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η πάστα Simplee Retraction προορίζεται για προσωρινή υποχώρηση και αιμόσταση του περιθωριακού ουλικού ιστού κατά τη διάρκεια κλινικών διαδικασιών, όπως η λήψη αποτυπωμάτων χωρίς ούλα και ακριβή, η τοποθέτηση σταθερών προσθετικών αποκαταστάσεων και άλλες θεραπείες αποκατάστασης των δοντιών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η πάστα δεν πρέπει να καταπίνεται και αντενδείκνυται για χρήση σε ή από άτομα που είναι αλλεργικά ή ευαίσθητα σε χλωριούχο αργίλιο, πυριτικά άλατα ή παρόμοια προϊόντα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν δερματίτιδα ή φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Διακόψτε τη χρήση εάν συμβεί αυτό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε είναι θεραπεία για ενεργή περιοδοντική νόσο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Η πάστα Simplee Retraction πρέπει να χρησιμοποιείται στα ουλικά σουλκούς πάνω από το επίπεδο του σημείου επαφής.
• Η άκρη της κάψουλας μονάδας δόσης πρέπει να τοποθετείται στο στόμιο του σουλκού χωρίς πραγματικά να διεισδύει σε αυτό. Η πάστα πρέπει να πιέζεται αργά στο σουλκούλι για να μην εκτοξεύεται το υλικό υπό πίεση στους παρωδοντικούς ιστούς.
• Αφού η πάστα παραμείνει στο σουλκούλι για περίπου 2 λεπτά, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Το σουλκούλι πρέπει να ξεπλένεται καλά με νερό και να επιθεωρείται για υπολειμματικό υλικό, έτσι ώστε να μην παραμένει υλικό στην επιφάνεια των δοντιών ή των ούλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αποθηκεύστε την πάστα Simplee Retraction σε δροσερό, σκοτεινό μέρος για χρήση, μακριά από τα μάτια των παιδιών.
• Οι κάψουλες μονάδας δόσης προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.
• Αποφύγετε το φως του ήλιου και τις πηγές θερμότητας. Η διάρκεια ζωής θα μειωθε